

آمپول

دگزامتازون

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف به دیگران خودداری فرمایید.

در صورت وجود هر گونه ابهام و سؤال در رابطه با مندرجات این برگه راهنما، با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- داشتن حساسیت به کورتیکواستروئیدها، سایر مواد مثل غذاها، مواد محافظ یا رنگها.

- در صورت مصرف طولانی مدت این دارو، احتمال تجویز رژیم غذایی توسط پزشک وجود دارد. این رژیم غذایی حاوی مقدار کمی نمک و غنی از پتاسیم و پروتئین بوده و میزان کالری آن برای جلوگیری از افزایش وزن کنترل شده است.

- افراد مسن بخصوص خانم های یائسه، دلیل شانس ایجاد پوکی استخوان و افزایش فشار خون.

- در صورت مصرف داروهایی که سطح پتاسیم خون را تغییر می دهند مثل آمفوتریسین B، گلیکوزیدهای دیورتال، دیورتیک ها.

- در صورت مصرف سایر داروهای استروئیدی

- در صورت مصرف داروهای آنتی دیابتیک

- در صورت حاملگی یا شیردهی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف در دوران بارداری و شیردهی فقط طبق نظر پزشک متخصص مجاز می باشد.

بر اساس طبقه بندی سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA)، دگزامتازون در دوران بارداری در رده C قرار دارد.

کورتیکواستروئیدها در شیر ترشح می شوند.

هشدارها و نکات قابل توجه:

- در صورتی که پس از استفاده از این دارو دچار تاری دید و یا هر گونه اختلال بینایی شدید، در اسرع وقت به چشم پزشک مراجعه کنید.

- بدون اطلاع پزشک معالج دارو را قطع نکنید.

- مصرف طولانی مدت این دارو در کودکان می تواند منجر به کندی یا مهار رشد شود.

- هنگام مصرف و حتی بعد از مصرف این دارو نباید هیچگونه ایمن سازی صورت گیرد مگر با نظر پزشک.

- در صورت مصرف کورتیکواستروئیدها از تماس با افرادی که اخیراً "واکسن پولیو دریافت کرده اند و یا آبله مرغان یا سرخک گرفته اند بپرهیزید به ویژه در مورد کودکان.

- در هنگام مصرف طولانی مدت این دارو معاینه چشم بطور مرتب صورت گیرد.

- در صورت داشتن بیماری های زیر حین مصرف این دارو با پزشک مشورت کنید:

سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS)، عفونت ویروسی و قارچی، عفونت چشمی از هریس سیمپلکس، جراحی اخیر، جراحات جلدی، آلودگی روده با کرم قلابدار، سل، زخم معده، گلوکوم، میاستنی گراویس، سایکوز، لوپوس اریتماتوز سیستمیک.

- کورتیکواستروئیدها مقاومت بدن را به عفونت کاهش می دهند. در صورت بروز هر گونه علامت احتمالی عفونت مثل گلودرد، تب و سرفه به پزشک مراجعه نمایید.

- در صورت تزریق داخل مغصلی این دارو از وارد آوردن استرس یا کشیدگی زیاد مفصل خودداری کنید.

- هر گونه قرمزی یا تورم در محل تزریق را با پزشک در میان بگذارید.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف تزریقی معمول این دارو به قرار زیر است:

دوز بزرگسالان (حداکثر ۸۰ میلی گرم در روز):

در مواردی که درمان با کورتیکواستروئیدها مورد نیاز است:

تزریق Intraleosomal با بافت نرم: ۶-۲۰ میلی گرم؛ در صورت نیاز به فاصله سه روز تا سه هفته تکرار می شود.

عضلانی یا وریدی: ۹-۵ میلی گرم در روز

شوک:

مقدار مصرف با توجه به شرایط بیمار توسط پزشک تعیین می شود ولی دوز معمول بقرار زیر است:

۱ میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن، بصورت وریدی به عنوان تزریق واحد استفاده میشود.

ادم مغزی:

۱۰ میلی گرم وریدی بعنوان دوز اولیه که تا فروکش کردن علائم با دوز ۴ میلی گرم عضلانی هر ۶ ساعت ادامه می یابد.

دگزامتازون

آمپول

دوز نگهدارنده: ۲ میلی گرم عضلانی دو یا سه بار در روز که بعداً" با توجه به وضعیت بیمار تنظیم می گردد.

بیماریهای آلرژیک:

۸-۳ میلی گرم عضلانی به عنوان دوز واحد، که درمان نگهدارنده با قرصهای خوراکی دگزامتازون ادامه می یابد.

تهوع و یا استفراغ ناشی از شیمی درمانی:

۲-۸ میلی گرم وریدی ۵ تا ۱۵ دقیقه قبل از شیمی درمانی، درمان با قرص خوراکی دگزامتازون ادامه می یابد.

دوز معمول کودکان:

درمان عدم کارایی آدرنوکورتیکال:

۰/۲۲- میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن، عضلانی در روز (منقسم در سه دوز) هر سه روز یکبار توجه:

مقادیر ذکر شده از دارو بر حسب دگزامتازون فسفات می باشد.

دگزامتازون به صورت داخل عضلانی، وریدی (به آمستکی طی یک یا چند دقیقه)، انفوزیون وریدی، Intraleosomal، داخل مفصل و یا در بافت نرم قابل استفاده می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موزات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود اگر چه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز و تداوم عوارض جانبی زیر با پزشک مشورت نمایید.

احتمال بروز عوارض جانبی در مصرف کوتاه مدت این دارو معمولاً" نادر است.

عوارضی که کمتر معمول هستند: کاهش یا تاری دید، تکرر ادرار، تشنگی

عوارض نادر:

کورگی (بطور ناگهانی در اثر تزریق در ناحیه سر یا گردن)، بی حسی، درد یا خارش در محل نزدیک آن، توهم، دیپرسیون، بدرفتاری، بی قراری، راش یا کهیر پوست.

عوارضی که با مصرف طولانی مدت بروز می کنند:

درد شکم یا معده، آکنه، مدفوع خونی یا تیره، تغییرات بینایی، درد، حساسیت و آبریزش چشم، سردرد، ضربان نامنظم قلب، مشکلات قاعدگی، ضعف عضلانی، تهوع و استفراغ، زخم و تغییر شکل در محل تزریق، پوست نازک و براق، مشکلات خواب، خستگی و ضعف غیر معمول، افزایش وزن، تأخیر در بهبودی زخم

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و مشاهده علائم مسمومیت بیمار بایستی سریعاً به بیمارستان منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- زو ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری شده و از یخ زدگی محافظت گردد.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

- تا هنگام مصرف این دارو را درون جعبه نگهداری کنید.

بسته بندی:

۱۰۰ عدد آمپول ۲ میلی لیتری (هر آمپول محتوی ۸ میلی گرم دگزامتازون فسفات) در جعبه مقوایی به همراه یک برگه راهنمای بیمار.

۱۰ عدد آمپول ۲ میلی لیتری (هر آمپول محتوی ۸ میلی گرم دگزامتازون فسفات) در جعبه مقوایی به همراه یک برگه راهنمای بیمار.

Reference: USP DI, for the health care professional: 2007

AN: Dexamethasone Amp - 204

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو به مسئول پستی: ۱۲۱۵۵۸-۵۵۹

و یا پست الکترونیکی: info@osvahpharma.com ارسال فرمائید.

OSVE
شرکت داروسازی اسوه
www.osvahpharma.com

DEXAMETHASONE BRO | 140 x 85 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: Naseri 1401/03/07

Print description: Pantone No.: 7406 C | Black