

ازتیکول® قرص

از تیمایب

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری کنید.

راهنمایی های عمومی:

لازم است قبل از مصرف این دارو چنانچه بیمار دارای سابقه حساسیت به این دارو و یا سابقه نارسایی کبدی است، پزشک خویش را مطلع سازد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و کنترل شده در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری وجود ندارد. این دارو از نظر رده مصرف در دوران بارداری سازمان غذا و داروی آمریکا در رده C می باشد. در مورد مصرف این دارو در دوران شیردهی و ترشح آن در شیر مادر مطالعات کافی انجام نشده است. استفاده از آن در این دوران توصیه نمی شود مگر با در نظر گرفتن فواید استفاده از آن نسبت به خطرات احتمالی ناشی از مصرف آن برای شیرخوار. در صورتی که باردار هستید و یا قصد باردار شدن دارید و یا در صورتی که در دوران شیردهی می باشید حتماً درمورد مصرف این دارو با پزشک مشورت کنید.

موارد احتیاط:

مانیتورینگ عملکرد کبدی در صورت مصرف همزمان با داروهای مهار کننده HMG_CoA ردوکتاز (نظیر سیمواستاتین ، اتورواستاتین ، لوواستاتین ، فلوواستاتین و پراواستاتین) توصیه می شود.

ازتیکول با داروهای زیر تداخل دارویی دارد؛ لذا چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید پزشک خود را مطلع سازید:

کلستیرامین، فیبرات ها (فنوفیبرات و جم فیبروزیل)، سیکلوسپورین، استاتین ها و وارفارین

موارد و مقدار مصرف:

این دارو را دقیقاً مطابق شیوه ای که پزشکتان دستور داده استفاده فرمایید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار تجویز معمول قرص ازتیکول به قرار زیر است:

دوز بزرگسالان: میزان مصرف جهت درمان هیپرکلسترولمی اولیه، هیپرکلسترولمی خانوادگی ژنتیکی و سیسترومولی ژنتیکی به صورت تنها و یا به همراه داروهای مهار کننده HMG_CoA ردوکتاز (نظیر سیمواستاتین، اتورواستاتین، لوواستاتین، فلوواستاتین و پراواستاتین) ۱۰ میلی گرم در روز می باشد.

مصرف ازتیکول در کودکان زیر ۱۰ سال توصیه نمی شود.

در خصوص نحوه صحیح مصرف لازم است به نکات زیر توجه فرمایید:

- هرگز بیش از مقدار تجویز شده توسط پزشک مصرف نکنید.
- این دارو را می توان با معده خالی یا همراه غذا با یک لیوان آب مصرف نمود.
- در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است، از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. اگرچه همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد، لیکن در صورت بروز هر یک از آنها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت بروز: واکنش های حساسیتی شامل آنژیوادم و بثورات پوستی (تورم وسیع به شکل کبیر بر روی صورت، پلک ها لب ها، گلو، دست ها، ساق پاها، اندام های جنسی)

عوارضی که در صورت ادامه داشتن یا آزاردهنده بودن باید به پزشک اطلاع داده شود:

تب، سردرد، درد عضلانی، آبریزش بینی، گلودرد، درد پشت، درد بدن، درد قفسه سینه، لرز، حساس شدن، سرماخوردگی یا نشانه های مشابه آنفولانزا، دردهای شکمی، اسهال، درد های مفصلی، کمردرد، سرگیجه، دردهای عضلانی، خستگی، سرفه، تنفس صدادار، اشکال در بلع.

مسمومیت یا دوزهای بیش از اندازه:

در صورت مصرف اتفاقی دوزهای بیش از حد لازم، فوراً با پزشک خویش تماس حاصل فرمایید و یا خود را به یک واحد درمانی برسانید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی:

- ۱۰۰ قرص ۱۰ میلی گرمی در یک جعبه به همراه یک بروشور

Reference: USP DI; for Healthcare Professional, 2007

AN: Ezetichol - 203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو

به صندوق پستی: ۱۵۴۲-۱۳۷۸

و یا پست الکترونیکی: info@osvahpharma.com ارسال فرمایید.

OSV

شرکت داروسازی اسوه
www.osvahpharma.com



EZETICOL 10 BRO | 140 x 85 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: 00/03/29 Hosseini