

مقدار و نحوه مصرف دارو:

با دقت برنامه غذایی مخصوصی که پزشکتان برای شما تجویز نموده است دنبال نمایید. این امر برای کنترل شرایط شما مهم است. همچنین ورزش منظم و آزمایش قند خون با ابزار را طبق دستور پزشک بطور منظم انجام دهید. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو برای بزرگسالان به قرار زیر است. در کودکان مقدار و نحوه مصرف باید توسط پزشک تعیین شود.

برای دیابت نوع ۲:**گلو تازون® به تنهایی:**

بزرگسالان: در ابتدا ۱۵ یا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز همراه با غذا یا با فاصله از غذا. پزشک ممکن است پس از مدتی دوز را تا ۴۵ میلی گرم یک بار در روز افزایش دهد.

همراه با انسولین، متفورمین و یا سولفونیل اوره ها:

بزرگسالان: در ابتدا ۱۵ یا ۳۰ میلی گرم یک بار در روز همراه با غذا یا با فاصله از غذا. در صورت و ضرورتی که یک بار مصرف این دارو فراموش کردید پس از به یاد آوردن بلافاصله آن را مصرف نمایید. با این وجود اگر زمان دوز بعدی نزدیک بود، دوز فراموش شده را استفاده نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید.

عوارض جانبی:

به طور کلی تمام داروها به موازات اثرات درمانی، دارای برخی عوارض ناخواسته هستند. البته لزوماً همیشه و تمام عوارض ذکر شده برای این دارو رخ نخواهد داد. در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر، در اسرع وقت با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: مشکلات در دندانها، ورم پاها یا ساق یا افزایش وزن، تاری دید، خشکی دهان، خشکی، گر گرفتگی، پوست خشک، استشمام بوی میوه از تنفس، افزایش گرسنگی و تشنگی، افزایش ادرار، عدم هوشیاری، تهوع، درد معده، تعریق، اشکال در تنفس، کاهش وزن بی دلیل، استفراغ، سرخه، تب، سردرد، درد مفاصل، آبریزش یا گرفتگی بینی، گلودرد، آئمی

شرایط نگهداری:

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

بسته بندی:

۱۰۰ - عدد قرص ۳۵ میلی گرمی در یک جعبه به همراه یک بروشور
۱۰۰ - عدد قرص ۳۰ میلی گرمی در یک جعبه به همراه یک بروشور
۱۰۰ - عدد قرص ۲۵ میلی گرمی در یک جعبه به همراه یک بروشور

Reference: USP DI Drug Information for the Health Care Professional 2007

AN: Glutazone® -203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو به مسئول پستی: ۱۵۵۴-۱۲۱۸۵ و یا پست الکترونیکی: info@osvapharma.com ارسال فرمایید.

OSV

شرکت داروسازی اسوه
www.osvapharma.com

گلو تازون® یک داروی کنترل کننده قند خون از دسته تیاژولیدین دیون است که در کنترل بیماری دیابت نوع دو در کنار ورزش و رژیم غذایی به کار می رود. همچنین این دارو در مواردی که درمان تک دارویی به اندازه کافی کنترل کننده نباشد می تواند در کنار دیگر داروهای ضد دیابت استفاده شود. مطالب این برگه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و در صورتی که سوال یا نکته مبهمی در رابطه با مطالب ذکر شده پیش آمد با پزشک یا داروساز مشورت کنید. این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا آن مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری فرمایید.

راهنمایهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:
- در صورت داشتن سابقه حساسیت به پیوگلیتازون، غذاها، مواد محافظ و رنگها
- در صورت مصرف دارو های دیگر

مصرف در دوران بارداری یا شیردهی:

این دارو از نظر طبقه بندی مصرف در دوران بارداری سازمان غذا و داروی آمریکا در رده C قرار دارد. مصرف این دارو در دوران بارداری تنها با نظر پزشک متخصص و در صورت لزوم مجاز است. مطالعات کافی در مورد ترضع این دارو در شیر مادر وجود ندارد. مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

هشدارها و نکات قابل توصیه:

- در صورت احساس درد معده یا شکمی، ادرار تیره رنگ، از دست دادن اشتها، تهوع یا استفراغ، خشکی غیر معمول یا ضعف و چشمان یا پوست زرد رنگ، فوراً به پزشکتان اطلاع دهید. این موارد ممکن است نشانه هایی از مشکلات کبدی باشند.

- بسیاری مهم است که پزشک وضعیت سلامت و روند کنترل قند خون شما را در معاینات و آزمایشات منظم، بررسی نماید تا مطمئن شود که این دارو اثر بخشی مناسب دارد. بنابراین ضمن مراجعه منظم به پزشک و انجام آزمایشات دوره ای از وضعیت سلامت خود مطمئن شوید.

- در صورت نیاز به مصرف هر داروی دیگر (از جمله داروهای مورد استفاده در سرماخوردگی و غیره) با پزشک در این زمینه مشورت کنید تا از تداخلات دارویی جلوگیری کنید.

- در مسافرت ها سابقه پزشکی و آخرین نسخه خود را همیشه همراه داشته باشید و آنرا برای مواقع اورژانس آماده بگذارید. تغییرات بوجود آمده در زمان و ساعت را در نظر بگیرید و وعده های غذایی خود را تا حد امکان نزدیک به وعده های غذایی معمول نگهدارید.

- در مواقع اورژانس ممکن است بدلیل بیماری دیابت نیاز به توجهات ویژه داشته باشید. بهتر است یک دست بند یا گردنبنند حاوی مشخصات و اطلاعات پزشکی در تمام اوقات همراه داشته باشید. همچنین یک کارت شناسایی نشاندهنده دیابت همراه لیستی از داروهایتان را همراه در کیفتان داشته باشید.

- این دارو باعث هیپوگلاسمی (افت زیاد قند خون) نمی شود. با این وجود اگر

گلو تازون® با دیگر داروهای کاهنده قند خون مانند انسولین، متفورمین یا گلی بنکلاید (گلی بوراید) مصرف شود، ممکن است افت قند خون رخ دهد. همچنین افت قند خون ممکن است در صورت تاخیر در مصرف یک وعده غذایی یا یک میان وعده غذایی، ورزش بیش از اندازه معمول، نوشیدن الکل یا عدم توانایی در خوردن بدلیل تهوع یا استفراغ اتفاق بیافتد. نشانه های افت قند خون عبارتند از: اضطراب، تغییر در رفتار مشابه افراد مسن، تاری دید، عرق سرد، گیجی، پوست پریونگ و سرد، مشکل در فکر، سرگیجه، گرسنگی شدید، ضربان قلب بالا، سردرد مداوم، تهوع، عصبی شدن، کابوس، خواب نازام، لرز، صحبت نامفهوم یا خشکی غیر معمول یا ضعف.

- اگر نشانه های افت قند خون رخ داد می توانید از قرص گلوکز یا ژل آن، عمل یا جبه های قند استفاده نمایید. همچنین می توانید از آمیوه، نوشابه غیر رژیمی یا شکر حل شده در آب برای برطرف نمودن علائم استفاده کنید. برای اطلاع از پایین بودن قند خون، به کمک دستگاه های اندازه گیری که در بازار موجود است قند خون خود را کنترل نمایید. گلوکاگون در مواقع اورژانس زمانی که علائم شدید مانند تشنج یا عدم هوشیاری اتفاق می افتد، مصرف می شود.



Glutazone BRO | 170 x 120 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: 95/12/22