

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنمایی های عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:
• در صورت داشتن حساسیت به سوماتریتان یا به نسبت به موارد دیگر مثل غذاها، مواد محافظ یا رنگها.
• در صورت مصرف داروهای دیگر (حتی داروهای بدون نسخه) بویژه داروهای تجویز شده برای سردرد های میگرنی و نیز در صورت استعمال دخانیات.
• در صورت ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی، آذنین، سابقه بیماری عروقی مغزی، استعداد ابتلا به بیماری های عروقی کرونری، نقص عملکرد کبدی و کلیوی، افزایش فشار خون (کنترل نشده) و تکی کاردی.
مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
این دارو از نظر طبقه بندی در دوران بارداری در رده C قرار گرفته و در نتیجه در صورت ضرورت طبق نظر پزشک متخصص و با در نظر گرفتن فواید و مضرات برای مادر و جنین، مصرف مجاز است.
سوماتریتان در شیر ترشح می شود بنابراین احتیاط لازم بایستی هنگام تجویز میگروستاپ® برای یک مادر شیرده رعایت گردد.
هشدارها و نکات قابل توجه:

توزیع این دارو فقط بصورت زیر جلدی می باشد. از تزریق وریدی و یا عضلانی آن جداً خودداری نمایید.
• مصرف همزمان میگروستاپ® با داروهای مهار کننده مونو آمینو اکسیداز (فورازولیدون، ایزوکربوکسازید، فنلژین، پروکاربازین، سلؤلین، ترانیل سیپرومین) ممنوع می باشد. حداقل ۱۴ روز فاصله بین مصرف داروهای ذکر شده با میگروستاپ® بایستی وجود داشته باشد.
• مطالعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال انجام نشده است.
• این دارو فقط در صورت تشخیص صحیح میگرن یا سردرد خوشه ای بکار می رود. بنابراین جهت درمان سردرد های غیر میگرنی توصیه نمی گردد.
• این دارو نبایستی بعنوان درمان پیشگیرانه مصرف گردد. دارو را بعد از شروع سردرد مصرف نمایید.
• از مصرف این دارو بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و یا دفعات بیشتر مصرف جداً خودداری نمایید.
• از مصرف الکل (بعلاوه بدتر کردن سردرد) اجتناب ورزید.
• این دارو نبایستی در طول ۲۴ ساعت پس از مصرف داروهای حاوی ارگوتامین، مثل دی هیدروارگوتامین یا متی سرژید و نیز سایر آگونیستهای 5HT₁ مصرف گردد. همچنین مصرف داروهای حاوی ارگوتامین در فاصله کمتر از ۶ ساعت از مصرف سوماتریتان مجاز نمی باشد.
• احتمال زیاد ایجاد خواب آلودگی و یا گیجی در طول سردرد میگرن و با مصرف این دارو وجود دارد بنابراین از رانندگی و کار با وسائلی که نیاز به هشیاری کامل دارند بپرهیزید.
• برای کمک به تسکین بهتر، توصیه می گردد مریض بعد از مصرف دارو در اتاق تاریک و ساکت استراحت نماید.
• در صورتی که ۲-۳ ساعت بعد از تزریق اول علائم میگرن بهبود پیدا نکرد تزریق دوم برای آن حمله نبایستی صورت گیرد.
• در صورتی که بعد از مصرف این دارو احساس بهبودی کردید ولی سردرد شما دوباره عود کرد و یا بعد از مدتی شدیدتر شد دوز دیگر سوماتریتان با فاصله ۶ ساعت از تزریق اول تحت نظر پزشک تجویز می گردد.
• این دارو نبایستی بیش از دو تزریق در ۲۴ ساعت مصرف گردد.
• اولین تزریق تحت نظر پزشک در درمانگاه یا بیمارستان انجام شود. برای حملات بعدی نحوه صحیح تزریق را از پزشک بیاموزید.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
برای میگرن یا سردرد های خوشه ای:

بزرگسالان: یک تزریق ۶ میلی گرمی زیر جلدی. در صورت برگشت علائم بعد از تسکین اولیه می توان یک دوز ۶ میلی گرم تزریق نمود. بشرطی که فاصله دو تزریق کمتر از یک ساعت نباشد.
کودکان: استفاده از این دارو و میزان مصرف توسط پزشک تعیین می گردد.

عوارض جانبی:

مواردی که نیاز به توجهات پزشکی دارند:

• عوارض با شیوع نادر

واکنش های آنافیلاکتیک، درماتیت، آلرژی

مواردی که در صورت تداوم یا مزاحمت نیاز به توجهات پزشکی دارند:

• عوارض با شیوع بیشتر

واکنش در محل تزریق، سوزش بینی، تهوع و یا استفراغ، احساس ناراحتی در فک، گلو، زبان، بینی، سینوس ها، سرگیجه، خواب آلودگی، گرگرفتگی، گیجی، آسیب عضلانی، کرامپ، ضعف.

• عوارض با شیوع کمتر

اضطراب، احساس عمومی خستگی یا کسالت عمومی، تغییر بینایی.

مسئومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک، بیمار بایستی به بیمارستان منتقل گردد.

شرایط نگهداری:

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

• از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری نمایید.

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

بسته بندی:

• جعبه محتوی یک آمپول به همراه سرنگ و برگه راهنمای دارو.

Reference:
USP DI Drug Information for the Health Care Professional 2007

AN: Migrstop Amp® -202

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو به مسئول پستی: info@osvapharma.com یا به پست الکترونیکی: info@osvapharma.com ارسال فرمائید.

OSV

شرکت داروسازی اسوه
www.osvapharma.com



MIGRSTOP BRO | 140 x 85 mm
OSVE Pharmaceutical Co.
Date: 97/12/18