

SIZE : 223mm×210mm

Date : 1401/11/04

Design: H.Naseri

Pantone No.:

Pantone  
2735C

Pantone  
Rubine  
RedC

## تیکاگرلور

## اسلینتا® قرص روکشدار

### راهنمایی های عمومی:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری کنید.  
- در صورت بروز هرگونه عارضه جانبی یا پزشک یا داروساز مشورت کنید. حتی عوارضی که ممکن است در این برگه راهنما ذکر نشده باشد.

### اسلینتا چیست؟

این دارو حاوی ماده موثره تیکاگرلور است. این دارو جزء گروه داروهای ضد پلاکت می باشد.

### موارد مصرف اسلینتا®:

اسلینتا در ترکیب با استیل سالیسیلیک اسید (یکی دیگر از عوامل ضد پلاکت) فقط در بزرگسالان مصرف می شود.

این دارو ممکن است برای شما پس از بروز هر یک از موارد زیر تجویز شده باشد:

• حمله قلبی

• آنژین ناپایدار (آنژین یا درد در ناحیه قفسه سینه که به خوبی کنترل نشده است)

اسلینتا® ریسک بروز حمله قلبی جدید، سکته مغزی یا مرگ ناشی از بیماری های مرتبط با قلب یا عروق خونی را کاهش می دهد.

### نحوه عمل اسلینتا®

اسلینتا® بر روی سلول های که پلاکت (ترومبوسیت) نامیده می شوند، اثر می گذارد. این سلول های خونی بسیار کوچک با تجمع یافتن در قسمتی از رگ که دچار آسیب شده است، موجب توقف خونریزی می شود. همچنین پلاکت ها می توانند باعث تشکیل لخته در عروق خونی قلب و مغز شوند و این موضوع ممکن است بسیار خطرناک باشد زیرا:

• لخته خون ایجاد شده می تواند به صورت کامل خون رسانی به بافت را قطع کند که این موضوع می تواند باعث سکته قلبی یا مغزی شود.  
• لخته خون می تواند عروقی که به قلب خون رسانی می کنند را نیز مسدود کند و جریان خون به سمت قلب کاهش یابد در نتیجه به صورت متناوب درد در قفسه سینه ایجاد می شود (آنژین ناپایدار)

اسلینتا® تجمع پلاکت ها را متوقف کرده در نتیجه احتمال تشکیل لخته خون و در پی آن کاهش جریان خون به بافت ها یا استفاده از این دارو کمتر می شود.

### موارد منع مصرف:

• اگر به تیکاگرلور یا هر یک از مواد جانبی این دارو حساسیت دارید.

• در حال حاضر خونریزی دارید.

• دچار سکته مغزی ناشی از خونریزی مغزی بوده اید.

• دچار بیماری کبدی شدید هستید.

اسلینتا® را همراه با داروهای زیر مصرف نکنید و در صورتی که اطمینان ندارید پیش از مصرف با پزشک یا داروساز مشورت کنید.

### مشورت کنید.

• کتوکوناژول

• کلاریترومایسین

• فکازیدون

• ریتوناویر و اتازاناویر

### هشدارها و اقدامات احتیاطی:

در صورتی که به هر یک از شرایط زیر دچار هستید، قبل از مصرف اسلینتا® با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

• اگر به دلایل زیر در معرض افزایش ریسک خون ریزی هستید:

- اخیرا جراحی جدی داشته اید.

- اخیرا جراحی (از جمله کار دندانپزشکی) داشته اید.

- وضعیتی دارید که بر انعقاد خون اثر گذار است.

- اخیرا خونریزی مدهه یا روده داشته اید.

• اگر باید تحت عمل جراحی قرار بگیرید (شامل کار دندانپزشکی نیز می شود). در زمان مصرف اسلینتا® احتمال خونریزی افزایش می یابد. ممکن است پزشک از شما بخواهد ۵ روز قبل از جراحی مصرف این دارو را قطع کند.

• اگر ضربان قلب شما به طور غیرمعمول کم است (معمولا کمتر از ۶۰ ضربان در دقیقه) و باتری قلب برای شما استفاده نشده است.

• اگر دچار آسم، مشکلات ریوی و تنفسی هستید.

• مشکلات کبدی دارید.

• اگر در آزمایش خون شما مقدار اوریک اسید بالاتر از حد مجاز باشد.

• در صورت مصرف همزمان اسلینتا® و هپارین: زیرا اسلینتا® می تواند بر تست تشخیصی اختلال پلاکتی ناشی از هپارین تاثیر بگذارد.

### کودکان و نوجوانان:

اسلینتا® برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

### اسلینتا® و سایر داروها:

اگر اخیرا داروهای زیر را مصرف کرده اید، در حال مصرف هستید و یا در آینده مجبور به استفاده از آنها هستید با پزشک یا داروساز مشورت کنید. زیرا اسلینتا® می تواند بر عملکرد برخی داروها اثر گذارد و برخی از داروها نیز بر عملکرد اسلینتا® اثرگذار هستند.

- مصرف روزانه بیش از ۴۰ میلی گرم از سیمو استاتین یا لو استاتین

- ریفامپیسین

- فنیتوئین کاربامازپین و فنوباریتال

- دیگوکسین

- سیگلوپورین

- کینیدین و دیلتازم

- وروپامیل و بتا بلاکرها

- مورفین و دیگر مخدر ها

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر که احتمال خونریزی را افزایش می دهد حتما با پزشک یا داروساز مشورت کنید:

• ضد انعقادهای خوراکی که اغلب به عنوان رقیق خون شناخته می شوند مانند وارفارین

• داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) که اغلب به عنوان ضد درد استفاده می شوند مثل ایبوپروفن و ناپروکسن.

• مهار کننده های انتخابی باز جذب سروتونین به عنوان ضد افسردگی مانند پاروکستین، سرتالین و سیتالوپرام

• سایر داروها نظیر: کتوکوناژول، کلاریترومایسین، فکازیدون، ریتوناویر و اتازاناویر، سیزاپراید، الگالوپیدهای ارگوت

• برخی داروها مانند فیبرینولیتیک ها که به عنوان حل کننده لخته خون استفاده می شود (استرپتوکیناز یا تپلزان) ممکن است ریسک خونریزی را افزایش دهد.

### بارداری و شیردهی

اگر باردار هستید یا تصمیم به بارداری دارید مصرف اسلینتا® پیشنهاد نمی گردد.

خاتم ها باید هنگام مصرف این دارو از روش های جلوگیری از بارداری مناسب استفاده نمایند.

اگر در دوران شیردهی هستید قبل از مصرف این دارو حتما با پزشک مشورت کنید.

• **رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارد:**

اسلینتا® بر توانایی شما در رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارد، تاثیر نمی گذارد. اگر هنگام مصرف این دارو احساس سرگیجه داشتید موقع رانندگی و انجام کار با وسایل، دقت بیشتری کنید.

### مقدار و نحوه مصرف اسلینتا®

• همیشه دارو را مطابق با آنچه پزشک تجویز کرده مصرف کنید و تا زمانیکه پزشک تشخیص دهد، دارو باید مصرف شود.

• دوز معمول قرص اسلینتا® ۹۰ میلی گرم: در ابتدا دوز قرص ۹۰ میلی گرم با هم (معادل ۱۸۰ میلی گرم) به عنوان دوز شروع تجویز می شود سپس با یک قرص ۹۰ میلی گرم دوبار در روز تا مدت ۱۲ ماه ادامه می یابد مگر اینکه پزشک شما طریق مصرف دیگری را تجویز نماید.

• دوز معمول قرص اسلینتا® ۶۰ میلی گرم: یک قرص ۶۰ میلی گرم دو بار در روز

• معمولا پزشک استیل سالیسیلیک اسید را نیز همراه با اسلینتا® برای شما تجویز می کند و مقدار آن را نیز تعیین می نماید. اما به طور

معمول میزان تجویز استیل سالیسیلیک اسید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلی گرم است.

این دارو را زمان مشخص در روز مصرف کنید (به طور مثال یک قرص صبح و یک عدد شب)

• این دارو را می توانید همراه غذا یا بدون غذا مصرف کنید.

• اگر با بلعیدن قرص مشکل دارید می توانید قرص را به خوبی خرد کنید. قرص پودر شده را در نصف لیوان آب بریزید، مخلوط کرده و بلافاصله مصرف کنید. برای اطمینان از اینکه دوز دارو به طور کامل مصرف شده، مجددا نصف لیوان آب اضافه کرده و میل کنید.

• اگر در بیمارستان هستید ممکن است این دارو را با آب مخلوط کرده و از طریق یک لوله و از راه بینی به شما بدهند.  
• اگر مصرف یک دوز دارو را فراموش کردید فقط دوز بعدی را به صورت عادی مصرف کنید (به جای دوز فراموش شده دوز بعدی را دو برابر نکنید)

• بدون اطلاع پزشک مصرف اسلینتا® را قطع نکنید. قطع مصرف اسلینتا ممکن است احتمال ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی و یا مرگ در اثر بیماری های وابسته به قلب یا عروق خونی را افزایش دهد.

### مسمومیت دارویی

اگر اسلینتا® را بیش از اندازه مصرف کردید، فوراً با پزشک تماس گرفته یا به بیمارستان مراجعه کنید. بسته بندی دارو را جهت ارائه به بیمارستان یا پزشک همراه داشته باشید.

### عوارض جانبی

مانند سایر داروها این دارو نیز می تواند عوارض جانبی داشته باشد هرچند که این عوارض در همه بیماران دیده نمی شود.  
از آنجاییکه این دارو بر انعقاد خون اثر می گذارد، بیشتر عوارض آن مربوط به خونریزی است. ممکن است خونریزی در هر قسمت از بدن رخ دهد. برخی از خونریزی ها شایع هستند (مانند کبودی و خونریزی بینی). خونریزی های شدید غیرمعمول است اما می تواند تهدید کننده حیات باشد.

اگر متوجه یکی از علائم زیر شدید بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. ممکن است به در مان فوری نیاز باشد:

• خونریزی مغزی یا خونریزی داخل جمجمه یک عارضه جانبی غیرمعمول است و علائم سکته مغزی مثل موارد زیر را ایجاد می کند:

- بی حسی ناگهانی یا ضعف بازو، پا یا صورت به خصوص اگر در یک طرف بدن باشد

- گیجی ناگهانی، به سختی صحبت کردن یا مشکل در ادراک

- به سختی راه رفتن یا از دست دادن تعادل

- احساس سرگیجه یا سردرد شدید بدون علت

• علائم خونریزی مانند:

- خونریزی شدید و غیرقابل کنترل

- خونریزی غیرمنتظره یا خونریزی طولانی مدت

- استفراغ خونی یا قهوه ای رنگ

- مدفوع قرمز یا سیاه

• سرفه کردن یا استفراغ لخته خون

• غش کردن (از دست دادن موقت هوشیاری ناشی از کاهش ناگهانی جریان خون به مغز)

• علائم اختلال در انعقاد خون که پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک نامیده می شود، نظیر: تب، ایجاد لکه های برروی پوست یا داخل دهان (Purpura نامیده می شوند) یا یا بدون زرد شدن پوست یا چشم (زردی)، خستگی یا گیجی شدید و بدون علت.

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید.

• احساس تنگی نفس: این مورد بسیار رایج است. ممکن است به علت بیماری قلبی یا علل دیگر یا عوارض جانبی اسلینتا® باشد. احساس تنگی نفس در نتیجه استفاده از اسلینتا® عموما خفیف است و به صورت ناگهانی رخ می دهد و معمولا به صورت احساس نیاز شدید به هوا در حالت استراحت است و این حالت ممکن است در هفته های اول درمان یا اسلینتا® رخ دهد و در بسیاری از افراد به تدریج از بین می رود. در صورت بدتر شدن یا طولانی شدن احساس تنگی نفس، پزشک خود را مطلع کنید.

### سایر عوارض جانبی احتمالی:

• سیاه شایع:

• سطح بالای اسید اوریک خون

• خونریزی ناشی از اختلالات خونی

• شایع:

• کبودی

• سردرد

• احساس سرگیجه

• اسهال یا سوء هاضمه

• حالت تهوع

• بیخوابی

• راش

• خارش

• درد شدید و تورم در مفاصل (علائم نقرس)

• احساس سرگیجه یا تاری دید (از علائم افت فشار خون)

• خونریزی بیش از حد معمول بعد از جراحی، بریدگی و زخم

• خونریزی لته

• غیر شایع:

• واکنش آلرژیک (راش- خارش -تورم صورت ، تورم لب ها یا زبان)

• گیجی

• مشکل بینایی ناشی از وجود خون در چشم

• افزایش خونریزی قاعدگی یا خونریزی در زمان های غیر از زمان طبیعی آن

• خونریزی داخل مفاصل و عضلات که باعث تورم دردناک می شود

• وجود خون در گزش

• خونریزی داخلی که موجب سرگیجه شود

### شرایط نگهداری:

این دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- در زمان کمتر از ۳۰ سانتیگراد به دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

### شکل دارویی و بسته بندی:

- هر قرص روکشدار اسلینتا® ۹۰ میلی گرمی حاوی ۶۰ میلیگرم ماده موثره تیکاگرلور است.

- هر قرص روکشدار اسلینتا® ۹۰ میلی گرمی حاوی ۶۰ میلیگرم ماده موثره تیکاگرلور است.

- یک قطبی پلاستیکی حاوی ۶۰ عدد قرص روکشدار در یک جعبه مقوایی به همراه بروشور قرار می گیرد.

منبع: Electronic Medicines Compendium

AN.: Oselinta®-202

لغات و نشانه های در مورد این دارو

به مشق پیشانی ۱۵۵۲-۱۷۱۵

و پاست الکتریک: info@oselinta.com

oselinta

شرکت داروسازی اسوه

www.oselintpharma.com

SIZE : 223mm×210mm

Date : 1401/11/04

Design: H.Naseri

Pantone No.:

Pantone  
2735C

Pantone  
Rubine  
RedC

# OSELINTA® F.C.Tablet

## Ticagrelor

Oselinta® film-coated tablets

**Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.**

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

**What Oselinta® is**

Oselinta® contains an active substance called ticagrelor. This belongs to a group of medicines called antiplatelet medicines.

**What Oselinta® is used for**

Oselinta® in combination with acetylsalicylic acid (another antiplatelet agent) is to be used in adults only. You have been given this medicine because you have had:

- a heart attack, over a year ago
- Unstable angina (angina or chest pain that is not well controlled).
- It reduces the chances of you having another heart attack, stroke or dying from a disease related to your heart or blood vessels.

**How Oselinta® works**

Oselinta® affects cells called 'platelets' (thrombocytes).

However, platelets can also form clots inside diseased blood vessels in the heart and brain. This can be very dangerous because:

- The clot can cut off the blood supply completely; this can cause a heart attack (myocardial infarction) or stroke
- The clot can partly block the blood vessels to the heart; this reduces the blood flow to the heart and can cause chest pain which comes and goes (unstable angina).

Oselinta® helps stop the dumping of platelets. This reduces the chance of a blood clot forming that can reduce blood flow.

**Do not take Oselinta® if:**

- You are allergic to ticagrelor or any of the other ingredients of this medicine
- You are bleeding now.
- You have had a stroke caused by bleeding in the brain.
- You have severe liver disease.
- You are taking any of the following medicines:
  - Ketoconazole
  - Clarithromycin
  - Nefazodone
  - Ritonavir and Atazanavir

Do not take Oselinta® if any of the above applies to you. If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking this medicine.

**Warnings and precautions**

Talk to your doctor or pharmacist before taking Oselinta® if

- You have an increased risk of bleeding because of:
  - a recent serious injury
  - recent surgery (including dental work, ask your dentist about this)
  - you have a condition that affects blood clotting
  - recent bleeding from your stomach or gut
- You are due to have surgery (including dental work) at any time while taking Oselinta®. This is because of the increased risk of bleeding. Your doctor may want you to stop taking this medicine 5 days prior to surgery.
- Your heart rate is abnormally low (usually lower than 60 beats per minute) and you do not already have in place a device that paces your heart (pacemaker).
- You have asthma or other lung problems or breathing difficulties.
- You have had any problems with your liver or have previously had any disease which may have affected your liver.
- You have had a blood test that showed more than the usual amount of uric acid

If you are taking both Oselinta® and heparin:

Your doctor may require a sample of your blood for diagnostic tests if they suspect a rare platelet disorder caused by heparin. It is important that you inform your doctor that you are taking both Oselinta® and heparin, as Oselinta® may affect the diagnostic test.

**Children and adolescents**

Oselinta® is not recommended for children and adolescents under 18 years.

**Other medicines and Oselinta®**

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. This is because Oselinta® can affect the way some medicines work and some medicines can have an effect on Oselinta®.

• More than 40 mg daily of either simvastatin or lovastatin

- Rifampicin
- Phenytoin, Carbamazepine and Phenobarbital
- Digoxin
- Cyclosporine
- Quinidine and Diltiazem
- Beta blockers and Verapamil
- Morphine and other opioids
- In particular, tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines that increase your risk of bleeding:
  - Oral anticoagulants
  - NSAIDs
  - SSRIs

• Other medicines such as cisapride (used to treat heartburn), ergot alkaloids (used to treat migraines and headaches).

Also tell your doctor that because you are taking Oselinta®, you may have an increased risk of bleeding if your doctor gives you fibrinolytics, often called 'clot dissolvers', such as streptokinase or alteplase.

**Pregnancy and breast-feeding**

It is not recommended to use Oselinta® if you are pregnant or may become pregnant. Women should use appropriate contraceptive measures to avoid pregnancy while taking this medicine.

Talk to your doctor before taking this medicine if you are breast-feeding. Your doctor will discuss with you the benefits and risks of taking Oselinta® during this time.

**Driving and using machines**

Oselinta® is not likely to affect your ability to drive or use machines.

**How to take Oselinta®**

Always take this medicine exactly as your doctor has told you.

You can take the tablet with or without food.

**How much to take**

Patients taking Oselinta® should also take a daily low maintenance dose of ASA 75-150 mg, unless specifically contraindicated.

Acute coronary syndromes

Oselinta® treatment should be initiated with a single 180 mg loading dose (two tablets of 90 mg) and then continued at 90 mg twice daily.

Treatment with Oselinta® 90 mg twice daily is recommended for 12 months in ACS patients unless discontinuation is clinically indicated. History of myocardial infarction

Oselinta® 60 mg twice daily is the recommended dose when an extended treatment is required for patients with a history of MI of at least one year and a high risk of an atherothrombotic event. Treatment may be started without interruption as continuation therapy after the initial one-year treatment with Oselinta® 90 mg or other adenosine diphosphate (ADP) receptor inhibitor therapy in ACS patients with a

high risk of an atherothrombotic event. Treatment can also be initiated up to 2 years from the MI, or within one year after stopping previous ADP receptor inhibitor treatment. There are limited data on the efficacy and safety of ticagrelor beyond 3 years of extended treatment. If a switch is needed, the first dose of Oselinta® should be administered 24 hours following the last dose of the other antiplatelet medication.

**If you have trouble swallowing the tablet**

If you have trouble swallowing the tablet you can crush it and mix with water as follows:

- Crush the tablet to a fine powder.
- Pour the powder into half a glass of water.
- Stir and drink immediately.
- To make sure there is no medicine left, rinse the empty glass with another half a glass of water and drink it.

**If you take more Oselinta® than you should**

If you take more Oselinta® than you should, talk to a doctor or go to hospital straight away. Take the medicine pack with you. You may be at increased risk of bleeding.

**If you forget to take Oselinta®**

- If you forget to take a dose, just take your next dose as normal.
- Do not take a double dose (two doses at the same time) to make up for the forgotten dose.

**If you stop taking Oselinta®**

Do not stop taking Oselinta® without talking to your doctor. Take this medicine on a regular basis and for as long as your doctor keeps prescribing it.

**Possible side effects**

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

Oselinta® affects blood clotting, so most side effects are related to bleeding.

**See a doctor straight away if you notice any of the following – you may need urgent medical treatment:**

- Bleeding into the brain or inside the skull is an uncommon side effect, and may cause signs of a stroke such as:
  - sudden numbness or weakness of your arm, leg or face, especially if only on one side of the body
  - sudden confusion, difficulty speaking or understanding others
  - sudden difficulty in walking or loss of balance or co-ordination
  - suddenly feeling dizzy or sudden severe headache with no known cause
- Signs of bleeding such as:
  - bleeding that is severe or that you cannot control
  - unexpected bleeding or bleeding that lasts a long time pink, red, or brown urine
  - vomiting red blood or your vomit looks like 'coffee grounds'
  - red or black stools
  - coughing up or vomiting blood clots
- Fainting (syncope)
- a temporary loss of consciousness due to sudden drop in blood flow to the brain (common)
- Signs of a blood clotting problem called Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP) such as:
  - fever and purplish spots (called purpura) on the skin or in the mouth, with or without yellowing of the skin or eyes (jaundice), unexplained extreme tiredness or confusion

**Discuss with your doctor if you notice any of the following:**

- Feeling short of breath - this is very common. It might be due to your heart disease or another cause, or it might be a side effect of Oselinta®. Oselinta®-related breathlessness is generally mild and characterised as a sudden, unexpected hunger for air usually occurring at rest and may appear in the first weeks of therapy and for many may disappear. If your feeling of shortness of breath gets worse or lasts a long time, tell your doctor. Your doctor will decide if it needs treatment or further investigations.

Other possible side effects

Very common (may affect more than 1 in 10 people)

- High level of uric acid in your blood (as seen in tests)

• Bleeding caused by blood disorders

Common (may affect up to 1 in 10 people)

- Bruising
- Headache
- Feeling dizzy or like the room is spinning
- Diarrhea or indigestion
- Feeling sick (nausea)
- Constipation
- Rash
- Itching
- Severe pain and swelling in your joints – these are signs of gout
- Feeling dizzy or light-headed, or having blurred vision – these are signs of low blood pressure
- Nosebleed
- Bleeding after surgery or from cuts (for example while shaving) and wounds more than is normal
- Bleeding from your stomach lining (ulcer) Bleeding gums
- Uncommon (may affect up to 1 in 100 people)
- Allergic reaction – a rash, itching, or a swollen face or swollen lips/tongue may be signs of an allergic reaction.
- Confusion
- Visual problems caused by blood in your eye
- Vaginal bleeding that is heavier, or happens at different times, than your normal period (menstrual) bleeding
- Bleeding into your joints and muscles causing painful swelling
- Blood in your ear
- Internal bleeding, this may cause dizziness or light-headedness

**Dosage form and packaging:**

• Oselinta® 60 mg F.C Tablet contains 60 mg ticagrelor as active substance.

• Oselinta® 90 mg F.C Tablet contains 90 mg ticagrelor as active substance.

• A bottle of 60 film-coated tablets with a brochure in a card box.

**How to store Oselinta®**

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the bottle and carton.

Store below 30 °C, protect from moisture and light.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help to protect the environment.

Reference:

-Electronic Medicines Compendium

AN.: Oselinta®-202

You are kindly requested to contact us in case of  
any comments or advice.  
PO Box: 13185-1554  
Email: info@oselinta.com

**OSE**

OSVE Pharmaceutical Co.  
www.osvalpharma.com  
Tehran-Iran