

راهنمایی های عمومی:

طول اثر بیشتری نسبت به منادیون می باشد.

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

- ◀ در صورت سابقه حساسیت به ویتامین K یا مواد دیگر مثل غذاها، رنگها، مواد محافظ و غیره
- ◀ در صورت بارداری و یا شیردهی
- ◀ نوزادان به خصوص نوزادان نارس: دوزهای بالای فیتونادیون ممکن است همولیز، هیپر بیلی روبینمی و یرقان را به همراه داشته باشد. بنابراین در این دسته از بیماران دوزهای اضافه توصیه نمی شود.
- ◀ در صورت مصرف دارو (یا داروهای) دیگر
- ◀ سایر بیماریها به ویژه نارسایی کبدی

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

- ◀ رده C طبقه بندی FDA در دوران بارداری؛ بی خطری این دارو در دوران بارداری ثابت نشده لذا مصرف آن بایستی با صلاحدید پزشک صورت پذیرد.
- ◀ مصرف این دارو برای پیشگیری از خونریزی قبل از زایمان توصیه نمی شود زیرا احتمال آسیب به نوزاد وجود دارد.
- ◀ مصرف این دارو در دوران شیردهی بایستی با نظر پزشک صورت پذیرد.

مکانیسم اثر:

منادیون (محلول در آب) و فیتونادیون (محلول در چربی) دو فرم ویتامین K می باشند. ویتامین K سنتز فاکتورهای انعقادی (فاکتور II، VII، IX و X) را در کبد تحریک می کند. فیتونادیون (ویتامین K₁) دارای شروع اثر سریعتر و

موارد مصرف:

◀ پیشگیری و درمان هیپو پروترومبینمی

مقدار و نحوه مصرف:

- ◀ مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند. دارو را مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
- ◀ این آمپول را می توان به صورت زیر جلدی و داخل عضلانی تزریق نمود.
- ◀ در صورت جدا شدن یا ظهور قطرات روغنی از مصرف دارو خودداری کنید.
- ◀ پس از آماده سازی بلافاصله تزریق شود و باقیمانده آمپول دور ریخته شود.
- ◀ دوز فراموش شده: اگر یک دوز از این دارو فراموش گردید، در سریع ترین زمان ممکن آنرا مصرف نمایید. با این وجود اگر زمان دوز بعدی نزدیک بود، دوز فراموش شده را مصرف نکنید و دوزهای بعدی را نیز دو برابر نسازید. به پزشک خود هر دوزی را که فراموش نموده اید اطلاع دهید.

هشدارها و نکات قابل توجه:

- ◀ در صورت مراجعه به پزشک دیگر و یا دندانپزشک، ایشان را از مصرف این دارو مطلع سازید.
- ◀ واکنش های حساسیتی با تزریق زیر جلدی و داخل عضلانی این دارو گزارش شده است.
- ◀ قبل از شروع و یا قطع مصرف هر داروی دیگری (حتی داروهای بدون نسخه) آنرا با پزشک خود در میان بگذارید.
- ◀ معاینات مرتب توسط پزشک برای چک نمودن چگونگی پیشرفت درمان ضروری است.

تداخلات دارویی:

مصرف این دارو با داروهای زیر تداخل دارد:

◀ آنتی کوآگولانتهای کومارینی یا مشتقات ایندنادیون:
مصرف ویتامین کا می تواند باعث کاهش اثربخشی این دسته از داروها گردد.

◀ سایر داروهای همولیتیک: ریسک تشدید سمیت

◀ محلول تزریقی فیتونادیون با محلول تزریقی فنی توئین
ناسازگاری فیزیکی دارد.

در صورت مصرف هر داروی دیگر به پزشک خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

◀ دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

◀ در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور نگهداری
و از یخ زدگی محافظت گردد.

◀ تا زمان مصرف، دارو را درون جعبه نگهداری نمایید.

بسته بندی:

◀ هر آمپول نیم میلی لیتری حاوی ۱ میلی گرم ویتامین کا
۱ (فیتونادیون)

◀ هر آمپول یک میلی لیتری محتوی ۱۰ میلی گرم ویتامین
کا ۱ (فیتونادیون)

◀ ۱۰ عدد آمپول به همراه یک بروشور در یک جعبه مقوایی

AN:40826-203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو

به صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۵۵۴

و یا پست الکترونیکی: info@osvahpharma.com ارسال فرمایند.



شرکت داروسازی اسوه

www.osvahpharma.com

◀ در طول مصرف این دارو، انجام منظم آزمایش Prothrombin time ضروری است. این آزمایش به پزشک کمک خواهد کرد تا درباره مقدار داروی مورد نیاز تصمیم گیری نماید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته گردد. اگرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود ولی در صورت بروز ممکن است نیاز به توجه یا مشورت با پزشک داشته باشید. این عوارض عبارتند از:

با میزان بروز کمتر:

با دوزهای بالای فیتونادیون در نوزادان: آنمی همولیتیک (سختی در تنفس، بزرگ شدن کبد، ورم تمام بدن، رنگ پریدگی)؛ هپیر بیلی روبینمی (زردی چشم یا پوست)؛ یرقان (زردی چشم یا پوست)

میزان بروز نادر:

آنافیلاکسی (تنفس سخت سریع و نامنظم، اشکال در بلع، گرگرفتگی یا قرمزی پوست، نفس نفس زدن، راش جلدی، کهیر با یا بدون خارش، کاهش ناگهانی در فشار خون، تورم صورت لبها یا پلک، احساس سنگینی روی قفسه سینه، خس خس سینه)؛ سیانوز (کبودی در پوست)؛ منگی؛ افت فشار خون (گدرا)؛ تعریق؛ ضربان قلب سریع و ضعیف
عوارض جانبی دیگری نیز ممکن است واقع شود که معمولاً به مراقبتهای پزشکی نیاز ندارد. این عوارض جانبی به احتمال زیاد در طی درمان از بین می روند. با این وجود اگر هر یک از عوارض جانبی زیر ادامه پیدا کرد و یا آزاردهنده بود به پزشک خود اطلاع دهید:

گرگرفتگی صورت، قرمزی، درد، یا تورم در محل تزریق
در صورت مشاهده هر عارضه دیگر، به پزشک خود اطلاع دهید.