

SIZE : 110mm×150mm

Date : 1402/07/17

Design: H.Naseri

Pantone No.:

Panton
2735C

Panton
2577C

ویتامین ب۱ ۳۰۰ قرص

راهنمایی عمومی:

برگه راهنمای را با دقت مطالعه و در صورت نیاز با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

این دارو برای بیماری‌های فلی شما تجویز شده است. از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه آن به دیگران جدا خودداری نمایید.

قبل از مصرف این فراورده در موارد زیر با پزشک مشورت کنید:

▪ حساسیت به ویتامین ب، و یا دیگر مواد تشکیل دهنده قرص

▪ مصرف داروهای کیاهی یا شیمیایی غیر نسخه‌ای

▪ بارداری و شیردهی

مواد مصرف:

جهت درمان کبود و ویتامین ب،

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقادیر مصرف دارو باید توسط پزشک تجویز شود.

در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی‌شود.

مواد مصنوعی:

حساسیت به ویتامین ب، یا مواد جانبی دارو

هشدارها و موارد اختیاط:

این دارو را بیش از دویست توصیه شده مصرف نکنید.

کمبود و ویتامین ب، به تنهایی نادر است و ممکن است

همراه با کمبود سایر ویتامین‌ها رخ دهد.

امکان پیشگیری از این عوارض وجود ندارد.

تداءات دارویی و تست های آزمایشگاهی:

مصرف برخی داروها از جمله fluorouracil موجب کاهش

غلظت سرمه و ویتامین ب، می‌شود. بنابراین ممکن است

دویست تیامین در بیماران مصرف کننده این دارو نیاز به

تنظیم داشته باشد.

مقادیر زیاد تیامین در خون می‌تواند روی برخی از

تست‌های آزمایشگاهی تاثیر بگذارد. در صورتی که

هرگونه نتیجه این دارو پذیرش خود را در

چریان مصرف این دارو قرار دهد.

بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود. در

صورت نیاز با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

ثاریز دارو در راننگی و کار با ماشین آلات:

ثاریز این دارو در توانایی راننگی و کار با ماشین آلات

بررسی شده است. در صورت مصرف دارو حتی از

هوشیاری خود از راننگی و شروع کار با ماشین آلات

اطمینان حاصل کنید.

AN.: Vitamin B₁ 300-203

لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این دارو

به مشترق پست: ۰۷۳۸۵-۰۲۳

و یا پست الکترونیک: info@osvapharma.com ارسال فرمائید.



شرکت دارویی اسوه
www.osvapharma.com

SIZE : 110mm×150mm

Date : 1402/07/17

Design: H.Naseri


Pantone No.:

Pantone
2735C

Pantone
2577C

Vitamin B₁ 300

Tablet



Category:

Vitamin, water soluble

Therapeutic indications:

For the treatment of thiamine deficiencies due to increased dietary requirements, reduced intakes, reduced absorption or increased excretion. Also for treatment of Wernicke-Korsakoff syndrome, beriberi and thiamine deficiency related to chronic alcoholism. Situations often accompanied by marginal thiamine deficiency and requiring supplementation include but are not limited to:

- Regular heavy drinking/chronic alcohol consumption
- High carbohydrate intake
- Heavy physical exertion
- Compromised nutritional status
- High dose diuretics
- Type I and Type II diabetes mellitus

Dose and administration:

The dose of the drug is determined by the doctor. Not recommended for children under 12 years.

Contraindications

Allergy or hypersensitivity to thiamine or to any of the excipients in tablets.

Warnings and precautions

- Simple vitamin B₁ deficiency is rare. Suspect multiple vitamin deficiencies.
- Serious hypersensitivity/anaphylactic reactions can occur.

Drug and other medical interactions

The thiamine antagonists thiosemicarbazone and 5-fluorouracil can neutralize the effect of thiamine. Patients using any of these treatments may need their thiamine dose adjusted.

Thiamine could give false positive results for urobilinogen determination by the Ehrlich's reaction. High doses of thiamine may interfere with spectrophotometric assays of theophylline plasma concentration.

Pregnancy and lactation

This product is not intended for use in pregnant or lactating women.

Effects on ability to drive and use machines

No studies on the effect on the ability to drive and use machines have been performed. However, patients should be cautioned to see how they react before driving or operating machinery.

Undesirable effects

Gastrointestinal disorders:

Mild gastrointestinal events such as nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain have been reported.

Immune system disorders:

Allergic and anaphylactic reactions, with symptoms of pruritis, urticaria, itching, hives, angioedema, abdominal pain, respiratory distress, tachycardia, palpitations, and shock have been reported in single cases.

Overdose

Overdose with this route of administration is unlikely. A suspected overdose should be treated symptomatically.

Storage

- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 30°C, protect from moisture and light.
- Do not store and use any expired medicine.

Packaging

Each tablet contains 300mg thiamine hydrochloride. 10 blisters of 10 tablets with a brochure in a cardboard box.

AN.: Vitamin B₁ 300-203

You are kindly requested to contact us in case of
any comments or advices.
PO Box: 13185-1554
Email: info@osvpharma.com



OSV Pharmaceutical Co.
www.osvpharma.com
Tehran-Iran